



# 子どもの予防接種


町では定期の予防接種を実施しています。  
定期予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が決められています。  
事前に医療機関に予約して、接種しましょう。



## ●町内の接種委託医療機関

医療機関名	所在地	電話番号	定期予防接種														
			ヒブ	肺炎球菌	四種	二種	ポリオ	BCG	麻しん風しん	麻しん	風しん	水痘	日本脳炎	子宮頸がん	B型肝炎	ロタ	
1 松前病院	筒井 1592	984-1300			○	○											
2 Dr. 盛次診療所	筒井 1540	961-6262													○		
3 おひさまファミリークリニック	筒井 399-1	984-0088				○				○	○	○	○	○	○		
4 友澤外科	北黒田 173-1	985-0511			○	○				○	○	○	○	○			
5 おち内科循環器科	大溝 508-12	960-3620								○	○	○	○	○			
6 木口ペインクリニック内科	西高柳 110-1	984-3729								○	○	○	○	○			
7 むかいだ小児科	恵久美 792-1	985-0115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8 武智泌尿器科・内科	恵久美 711	960-3555				○	2期							○	2期	○	
9 松野内科クリニック	大間 166-1	961-6677				○								○	○		
10 梶原クリニック	出作 1-1	960-3197				○								○	○	○	

※ 他市町の医療機関や予防接種に関する詳しい内容については、健康課総務係にお問い合わせください。



## ●定期予防接種

予防接種名	対象者	標準的な接種年齢	接種間隔	回数		
ヒブ (Hib) 感染症	生後 2 カ月～5 歳未満	初回接種開始	生後 2～7 カ月未満	27～56 日で 3 回 (1 歳未満)。その後、7～13 カ月の間で 1 回	4	
			生後 7～12 カ月未満	27～56 日で 2 回 (1 歳未満)。その後、7～13 カ月の間で 1 回	3	
			1 歳～5 歳未満		1	
小児の肺炎球菌感染症	生後 2 カ月～5 歳未満	初回接種開始	生後 2～7 カ月未満	27 日以上で 3 回 (2 歳未満)。その後 60 日以上あけて、生後 12～15 カ月の間で 1 回	4	
			生後 7～12 カ月未満	27 日以上で 2 回 (2 歳未満)。その後 60 日以上あけて、生後 12～15 カ月の間に 1 回	3	
			1～2 歳未満	60 日以上	2	
			2～5 歳未満		1	
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 三種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風) ポリオ急性灰白髄炎)	1 期初回	生後 2～90 カ月未満	生後 2～12 カ月未満	20～56 日	3	
	1 期追加		1 期初回終了後 12～18 カ月以内	1 期初回終了後 6 カ月以上	1	
	2 期	11・12 歳 (D T トキソイドを接種)	11 歳		1	
BCG (結核)	生後 12 カ月未満		生後 5～8 カ月未満		1	
麻しん風しん	1 期	1～2 歳未満			1	
	2 期	5～7 歳未満で小学校就学前の 1 年間			1	
水痘 (水ぼうそう)	生後 12～36 カ月未満	生後 12～15 カ月未満	3 カ月以上 12 カ月未満		2	
		※ 既に水痘にかかったことがある人は、定期接種の対象となりません。				
日本脳炎	1 期初回	生後 6～90 カ月未満	3 歳	6～28 日	2	
	1 期追加		4 歳	1 期初回終了後 6 カ月以上	1	
	2 期	9～13 歳未満	9 歳		1	
	特例	平成 7 年 4 月 2 日～19 年 4 月 1 日生まれの人：1 期と 2 期の残りの回数を 20 歳未満で				
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	サーバルックス	小学校 6 年生～高校 1 年生相当年齢の女性	12～13 歳	1 カ月以上後、1 回目から 5 カ月以上後かつ 2 回目から 2.5 カ月以上後	3	
	ガーダシル			1 カ月以上後、2 回目から 3 カ月以上後	3	
	シルガード			【15 歳以降に 1 回目を接種】1 カ月以上後、2 回目から 3 カ月以上後	3	
				【15 歳未満で 1 回目を接種】5 カ月以上後	2	
※平成 9 年 4 月 2 日～19 年 4 月 1 日生まれの女性で、未接種の人も対象です。 ※ワクチンの効果や副反応について医療機関とよく相談し、十分理解した上で接種するようにしてください。						
B型肝炎	生後 12 カ月未満		生後 2～9 カ月未満	27 日以上で 2 回。その後 1 回目から 139 日以上あけて 1 回	3	
ロタウイルス	ロタテック	生後 6～32 週以内	初回接種開始	生後 6～14 週 6 日未満	27 日以上で 3 回	3
	ロタリックス	生後 6～24 週以内			27 日以上で 2 回	2